

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Kepatuhan Konsumsi Obat terhadap Kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa :

1. Proporsi responden kasus lebih banyak pada responden yang tidak patuh mengonsumsi obat, memiliki sikap negatif terhadap pengobatan, responden yang menjalani lama pengobatan tuberkulosis lebih dari 6 bulan dan responden yang memiliki efek samping obat.
2. Terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi obat dengan kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) di Kota Padang.
3. Tidak terdapat hubungan antara sikap pasien terhadap pengobatan dengan kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) di Kota Padang.
4. Terdapat hubungan antara lama pengobatan dengan kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) di Kota Padang.
5. Tidak terdapat hubungan antara adanya pengawas minum obat dengan kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) di Kota Padang.
6. Terdapat hubungan antara adanya efek samping obat dengan kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) di Kota Padang.
7. Faktor yang paling dominan terhadap terjadinya penyakit *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) di Kota Padang yaitu kepatuhan konsumsi obat, lama pengobatan dan adanya efek samping obat.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

- a. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan Puskesmas dalam memberikan penyuluhan terkait kepatuhan konsumsi obat anti tuberkulosis pada pasien TB sehingga dapat meminimalisir meningkatnya kejadian TB MDR di Kota Padang.
- b. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan Puskesmas dalam upaya peningkatan penemuan kasus TB MDR pada pasien TB yang menjalani lama pengobatan TB lebih dari 6 bulan dan dicurigai merasakan gejala TB MDR.
- c. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan Puskesmas dalam upaya peningkatan tatalaksana efek samping obat ringan sampai berat serta memberikan penyuluhan tentang efek samping dari obat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam kajian mengenai faktor risiko lainnya yang berhubungan dengan kejadian TB MDR seperti kepemilikan BPJS, akses pelayanan kesehatan, pencegahan penularan TB MDR.